



International Conference on
NUTRITION AND HEALTH CARE

February 10-11, 2022 | Paris, France

<https://www.nutrition.scientexconference.com/>

✉ nutrition@scientexconferences.com

☎ +1 (346) 3481205

TITLE: ESTUDIO TRANSVERSAL PARA DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL ANTROPOMETRICO DE UN GRUPO DE MUJERES LACTANTES DE MEDELLÍN Y EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE SU LECHE MATERNA MADURA

Name: Beatriz López Marín

Affiliation: Profesor asociado de la Universidad de Antioquia

Country: Colombia

Email ID: beatriz.lopez@udea.edu.co

ABSTRACT (upto 300 words)

Introducción: Los lípidos de la leche materna (LM) están constituidos por diferentes ácidos grasos (AG) de vital importancia para el bebé. El contenido y tipo de AG de la leche humana puede variar según las reservas de grasa maternas. El propósito de este estudio fue determinar la relación entre el estado nutricional antropométrico de un grupo de mujeres lactantes y el perfil de AG de su LM madura.

Material y métodos: El estudio fue descriptivo, transversal y correlacional. El estado nutricional se evaluó en 50 mujeres sanas, a quienes se les tomó una muestra de LM por extracción manual, con mínimo 1 mes de estar amamantando, residentes en Medellín, utilizando Índice de Masa Corporal (IMC), Circunferencia de Cintura (CC), Circunferencia de Brazo (CB) y Circunferencia de Muslo Medio (CMM). Las muestras de LM fueron analizadas por cromatografía de gases.

Resultados: 52% de las mujeres presentó IMC entre sobrepeso y obesidad, 77 % CB > 27,1 cm, 64% obesidad central según CC y 56% presentó CMM > 50,1 cm. En cuanto a LM, los AG saturados arrojaron el mayor contenido 2,05±0,77 g/100mL, y en los insaturados predominó el ácido linoléico

0,677±0,31 g/100mL y sus isómeros 0,97±0,58 g/100mL. No se encontró correlación significativa ($p > 0,05$) entre IMC y el total de los AG saturados, monoinsaturados, poliinsaturados y grasa, aunque IMC se correlacionó ($r = 0,281$) con los AG saturados sintetizados en la glándula mamaria y de igual manera CB ($r = 0,308$) y CMM ($r = 0,298$).

Conclusión: No se encontró correlación entre IMC y perfil de AG. La LM analizada tiene mayor cantidad de AG omega 6 y menor omega 3 respecto a las recomendaciones de ingesta en lactantes y la relación insaturados/saturados fue similar a otros estudios.

BIOGRAPHY (upto 200 words)

Beatriz López Marín, es Nutricionista Dietista, Magister y Doctora en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, docente de la Universidad de Antioquia – Medellín – Colombia, en el área de alimentos, pertenece al grupo de investigación ICAS (impacto de los componentes Alimentarios en la salud), tiene varias investigaciones en temas relacionados con la nutrición, el desarrollo de alimentos y la salud, de los cuales ha publicado artículos y capítulos de libro. Maneja la línea de investigación en inmunonutrición del Doctorado en Ciencias de la Alimentación y la Nutrición Humana.



International Conference on
NUTRITION AND HEALTH CARE

February 10-11, 2022 | Paris, France

 <https://www.nutrition.scientexconference.com/>

 nutrition@scientexconferences.com

 +1 (346) 3481205

Presenter Name: Beatriz López Marín

Mode of Presentation: Oral.

Contact number: 3154119203



Upload your photo here.

